

CGI	Psykose	Bipolar	Depression
1 ikke syg			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depression i remission</li> <li>• Ønske om udtrækning af medicinsk behandling</li> </ul>
2 måske mental syg		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke om bipolar lidelse</li> </ul> <p><i>Ofte afklarende samtale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let/moderat depression, hvor der ikke er afprøvet medicinsk behandling eller psykologforløb.</li> </ul>
3 syg i mild grad		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mistanke om eller kendt med bipolar lidelse</li> <li>• Lette stemningsudsving</li> <li>• god sygdomsindsigt</li> <li>• delvis symptom mestring</li> <li>• omlægning af medicinsk behandling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• let depression/moderat depression, hvor der lige er opstartet medicinsk behandling eller psykolog</li> <li>• ikke afprøvet behandling sufficient</li> </ul>
4 syg moderat grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• psykotiske symptomer/eller ikke kendt fra tidligere</li> </ul> <p><i>Afklarende samtale</i></p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• symptom mestring: Hensigtsmæssig/med støtte fra andre</li> <li>• omlægning af medicinsk behandling</li> </ul> <p><i>Direkte til behandling</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beskrevne maniske/depressive symptomer</li> <li>• tydelige stemningsudsving</li> <li>• ændring (forværring) fra habituel tilstand</li> <li>• symptom mestring med støtte</li> <li>• omlægning af medicin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderat depression</li> <li>• suicidal tanker – men kan lave aftaler</li> <li>• psykologforløb eller medicinsk behandling afprøvet med nogen eller manglende effekt</li> <li>• hensigtsmæssig eller delvis symptom mestring</li> </ul>
5 syg i udtalt grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evt. psykotiske symptomer/eller kendt med psykoselidelse</li> <li>• Uhensigtsmæssig symptom mestring (selvskade, truende, misbrug)</li> <li>• komorbiditet særligt misbrug</li> <li>• suicidalrisiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kendt bipolar lidelse med maniske/depressive symptomer</li> <li>• betydelig adfærsændring</li> <li>• suicidalrisiko</li> <li>• evt. komorbiditet</li> <li>• uhensigtsmæssig symptom mestring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• moderat depression med suicidal tanker men ikke konkrete planer</li> <li>• svær depression uden psykotiske symptomer</li> <li>• uhensigtsmæssig symptom mestring evt. misbrug</li> <li>• sufficient behandling forsøgt i primær uden effekt</li> </ul>
6 syg i svær grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produktive psykotiske symptomer/eller kendt med psykoselidelse</li> <li>• Uhensigtsmæssig symptom mestring (selvskade, truende, misbrug)</li> <li>• manglende sygdomsindsigt</li> <li>• komorbiditet særligt misbrug</li> <li>• suicidalrisiko / tidligere suicidalforsøg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maniske/depressive symptomer beskrevet</li> <li>• uhensigtsmæssig symptom mestring herunder evt. misbrug</li> <li>• komorbiditet</li> <li>• suicidalrisiko / tidligere suicidalforsøg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• svær depression evt. med psykotiske symptomer</li> <li>• suicidalrisiko med planer</li> <li>• uhensigtsmæssig symptom mestring evt. misbrug</li> <li>• evt. manglende sygdomsindsigt</li> <li>• evt. komorbiditet</li> </ul>
7 mest ekstrem syg	<b>AKUT</b>	<b>AKUT</b>	

## Tilbagevisning

Skal visiteres ind til udredning eller behandling

**OFTEN AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE**

CGI	Personlighedsforstyrrelse	ADHD	PTSD (gælder ikke flygtninge)
1 ikke syg			
2 måske mental syg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklar/manglende symptombeskrivelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen symptomer (barn diagnosticeret med ADHD og nu forældre der ønsker udredning)</li> <li>Ingen komorbiditet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Symptomer/traume ikke beskrevet</li> </ul>
3 syg i mild grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mistanke/lette symptomer på personlighedsforstyrrelse</li> <li>Delvis mestring</li> <li>Ingen komorbiditet beskrevet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lette symptomer</li> <li>Ingen komorbiditet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lette symptomer/let traume beskrevet eller ikke beskrevet</li> <li>Delvis symptom mestring</li> <li>Ikke forsøgt behandlet i primær ved psykolog eller medicinsk</li> <li>Ingen komorbiditet</li> </ul>
4 syg moderat grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate symptomer beskrevet</li> <li>Ingen komorbiditet</li> <li>Ikke sufficient støtte i primær</li> <li>Ikke selvskadende</li> </ul> <p><i>Ofte tilbagevisning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate symptomer</li> <li>Ingen komorbiditet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate symptomer/let traume beskrevet/ikke beskrevet</li> <li>Ikke forsøgt sufficient behandlet i primær ved psykolog eller medicinsk</li> </ul> <p><i>Ofte tilbagevisning</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate symptomer beskrevet</li> <li>Evt. komorbiditet</li> <li>Evt. selvskadende adfærd</li> </ul> <p><i>Eventuel afklarende samtale</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate symptomer og traume beskrevet</li> <li>Evt. komorbiditet</li> </ul> <p><i>Eventuelt afklarende samtale</i></p>
5 syg i udtalt grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate til svære symptomer</li> <li>Kendt med personlighedsforstyrrelse og komorbiditet</li> <li>Symptom mestring med støtte</li> <li>Selvskadende adfærd</li> <li>Evt. suicidalrisiko</li> <li>Behandling uden effekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate symptomer</li> <li>OG</li> <li>Komorbiditet</li> <li>Evt. misbrug som komorbiditet</li> <li>Uhensigtsmæssig symptom mestring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate/svære symptomer og traume beskrevet</li> <li>Symptom mestring med støtte</li> <li>Behandling forsøgt uden effekt</li> <li>Evt. komorbiditet</li> <li>Evt. suicidaltanker</li> </ul>
6 syg i svær grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svær personlighedsforstyrrelse</li> <li>Uhensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>Svær selvskadende adfærd</li> <li>Svær komorbiditet</li> <li>Evt suicidalrisiko/tidligere suicidalforsøg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svære symptomer</li> <li>Svær impulsstyring (eks. trusler/vold)</li> <li>Evt. svær komorbiditet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moderate/svære symptomer og traume beskrevet</li> <li>Uhensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>Behandling forsøgt uden effekt</li> <li>Komorbiditet (evt. psykosesymp.)</li> <li>Evt. suicidaltanker/risiko</li> </ul>
7 mest ekstrem syg			

## Tilbagevisning

Skal visiteres ind til udredning eller behandling

**OFTEN AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE**

CGI	Belastning-/tilpasningsreaktion	OCD	Angst (ofte invalideret på funktionsniveauet)
1 ikke syg			
2 måske mental syg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Symptomer/belastninger ikke beskrevet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lette OCD symptomer/manglende beskrivelse af symptomer</li> <li>• Hensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>• Ikke afprøvet behandling i primær</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lette angst symptomer/manglende beskrivelse af symptomer</li> <li>• Hensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>• Ikke afprøvet behandling i primær</li> </ul>
3 syg i mild grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lette symptomer/lette belastninger beskrevet/ikke beskrevet</li> <li>• Delvis symptom mestring</li> <li>• Ikke forsøgt behandlet i primær ved psykolog eller medicinsk</li> <li>• Ingen komorbiditet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lette/moderate OCD symptomer</li> <li>• Ikke sufficient afprøvning af medicin og psykolog</li> <li>• Delvis symptom mestring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lette/moderate angstsymptomer</li> <li>• ikke sufficient afprøvning af medicin og psykolog</li> <li>• delvis symptom mestring</li> </ul>
4 syg moderat grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderate symptomer/lette belastninger beskrevet</li> <li>• Ikke forsøgt sufficient behandlet i primær ved psykolog eller medicinsk</li> <li>• Evt. let komorbiditet</li> </ul> <p><i>Ofte tilbagevisning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderate OCD symptomer</li> <li>• Velbehandlet komorbiditet /ikke dominerende komorbiditet</li> <li>• Delvis symptom mestring</li> <li>• Tidligere kendt med godt resultat af behandling</li> <li>• Ikke tidligere kendt – men aktuelt forsøgt psykologforløb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderate symptomer beskrevet (GAD score &gt;10)</li> <li>• Tidligere kendt med godt resultat af behandling</li> <li>• Ikke tidligere kendt – men aktuelt forsøgt psykologforløb og ønsker ikke medicinsk behandling</li> <li>• Symptom mestring med støtte</li> <li>• Evt komorbiditet</li> </ul>
5 syg i udtalt grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderate/svære symptomer og belastninger beskrevet</li> <li>• Symptom mestring med støtte</li> <li>• Behandling forsøgt uden effekt</li> <li>• Evt. komorbiditet</li> <li>• Evt. suicidaltanker</li> </ul> <p><i>Eventuel afklarende samtale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderate til svære OCD symptomer</li> <li>• Symptom mestring med støtte/ uhensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>• Sufficient behandling i primær uden/sparsom effekt</li> <li>• Eventuel komorbiditet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderate/svære symptomer på angst (GAD score 10-15)</li> <li>• Sufficient behandling i primær regi uden effekt.</li> <li>• Symptom mestring med støtte</li> <li>• Evt. komorbiditet</li> </ul>
6 syg i svær grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderate/svære symptomer og belastninger beskrevet</li> <li>• Uhensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>• Behandling forsøgt uden effekt</li> <li>• Komorbiditet (evt. psykosesympt.)</li> <li>• Evt. suicidaltanker/risiko</li> </ul> <p><i>Ofte afklarende samtale fremfor direkte i pakke</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svære OCD symptomer</li> <li>• Uhensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>• Sufficient behandling i primær uden effekt</li> <li>• Komorbiditet</li> <li>• Evt. suicidaltanker/risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svær angst symptomer (GAD score &gt;15)</li> <li>• Uhensigtsmæssig symptom mestring</li> <li>• Komorbiditet</li> <li>• Evt suicidaltanker</li> </ul>
7 mest ekstrem syg			

## Tilbagevisning

Skal visiteres ind til udredning eller behandling

OFTE AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE

CGI	Demens	Autisme	Oligofreni – med psykiatriske symptomer
1 ikke syg			
2 måske mental syg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke om nedsat hukommelse/let svækket hukommelse</li> <li>• Få symptomer demens beskrevet</li> <li>• Ingen psykiatriske symptomer beskrevet</li> </ul> <p><i>Videresendes til neurologerne</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke om autismspektrumforstyrrelse/ ingen symptomer beskrevet</li> <li>• Ikke kendt i regionpsykiatrien</li> </ul>	
3 syg i mild grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke om demens /Lettere symptomer på demens</li> <li>• Ingen psykiatrisk komorbiditet beskrevet</li> <li>• MMSE let nedsat</li> </ul> <p><i>Videresendes til neurologerne</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke/lette symptomer på autismspektrumforstyrrelse</li> <li>• Ønske om udredning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke om mental retardering ingen symptomer/ingen IQ beskrevet</li> <li>• Ikke kendt i regionpsykiatrien</li> </ul>
4 syg moderat grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke om moderate symptomer på demens</li> <li>• Mistanke, men ikke beskrevet psykiatriske symptomer/ eller psykofarmakologisk behandling</li> <li>• Betydelige/udtalte adfærds- eller psykiatriske symptomer</li> <li>• Symptom mestring med støtte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lette symptomer</li> <li>• Ikke sufficient støtte i primær regi</li> <li>• Ingen komorbiditet</li> </ul> <p><i>Tilbagevisning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendt med mental retardering <b>og</b> psykiatrisk sygdom</li> <li>• Mistanke om mental retardering, hvor der åbenlyst er tale om meget lav IQ <b>og</b> mistanke om psykiatrisk sygdom</li> <li>• Downs syndrom</li> <li>• Ringe påvirkning af adfærd</li> <li>• Ønske om vurdering af medicinsk behandling</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke kendt med autisme diagnose</li> <li>• Lette/moderate symptomer</li> <li>• Komorbiditet</li> </ul> <p><i>Eventuel afklarende samtale</i></p>	
5 syg i udtalt grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistanke om/kendt med demens</li> <li>• Svære adfærds- eller psykiatriske symptomer</li> <li>• Betydelig adfærdsændring</li> <li>• Støtte påkrævet eller plejehjemsbeoer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendt med autismspektrumforstyrrelse og henvises grundet komorbiditet (depression, angst eller psykose)</li> <li>• Delvis/ingen støtte i primær</li> <li>• Evt. suicidalrisiko</li> </ul> <p><i>Visiteres ofte til behandling af komorbid lidelse eller afklarende samtale mhp. behandlingsbehov</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendt med mental retardering <b>og</b> psykiatrisk sygdom</li> <li>• Downs syndrom</li> <li>• Komorbiditet (depression, angst eller psykose) beskrevet</li> <li>• Påvirkning af adfærd</li> <li>• Evt. suicidalrisiko</li> </ul>
6 syg i svær grad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svære demens symptomer</li> <li>• Uhensigtsmæssig adfærd (urolig, aggressiv)</li> <li>• Komorbiditet (psykose, depression, angst mv.)</li> <li>• Ofte plejehjemskrævende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendt med autismspektrumforstyrrelse</li> <li>• Svær komorbiditet</li> <li>• Evt suicidalrisiko</li> <li>•</li> </ul> <p><i>Visiteres til behandling af komorbid lidelse</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendt med mental retardering <b>og</b> psykiatrisk sygdom</li> <li>• Downs syndrom</li> <li>• Svær komorbiditet beskrevet</li> <li>• Væsentlig påvirkning af adfærd</li> <li>• Evt suicidalrisiko</li> </ul>
7 mest ekstremt syg			

## Tilbagevisning

Skal visiteres ind til udredning eller behandling

OFTE AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE